

ΠΡΟΣΟΧΗ



H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

EUH208: Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει

αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία

UFI: WYY2-G06E-K004-FPDV

εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα. Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προσώπου εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα. Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προσώπου και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.» **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η΄ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). **SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν ασφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. **SPe8:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρουσίας μελισσών.

ALAKAZAM

500 WG



Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)
flonicamid

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: flonicamid 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 48,82% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΔΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14855/23.01.2024

Ημερ. Παραγωγής / Αρ. Παρτίδας:

Βλέπετε στην επιφάνεια της συσκευασίας.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

https://links.jtcrop.net/GR_Alakazam500WG



Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείες προφυλάξεις και τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.

Οικ. Τετρ. 20 Β, K35-55, 57022, Βιομηχανική

περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 553354-7

E-mail: info@nitrofarm.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

500γρ.ε

Κάτοχος της άδειας:

JT Agro Europe sp z o.o.

Gate A, Aleja Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk, Πολωνία

www.jtcrop.com | info@jtcrop.com



ΑΝΟΙΞΤΕ

ΕΔΩ



2d matrix

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήστε τύποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Φράπα, Νεραντζιά, Περγαμύοντο): Για **Αφίδες Εσπεριδοειδών** (*Aphis citricola*, *Toxoptera auranti*, *Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), δόση: 3,5-10 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (10 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 - 300 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά): Για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Hyalopterus pruni*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzi*), δόση: 8-14 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (14 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 - 150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Κερασιά): Για **Αφίδες** (*Myzus cerasi*, *Myzus persicae*, *Hyalopterus pruni*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzi*), δόση: 8-14 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (14 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 - 150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Δαμασκηλιά): Για **Αφίδες** (*Hyalopterus pruni*, *Myzus persicae*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzi*), δόση: 8-14 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (14 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 - 150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά): Για **Αφίδες** (*Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis pyri*, *Eriosoma lanigerum*, *Aphis pomi*), δόση: 8-14 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (14 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 - 150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Αχλαδιά, Αχλαδιά – NASHI, Κυδωνιά): Για **Αφίδες** (*Dysaphis pyri*, *Eriosoma lanigerum*), δόση: 8-14 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (14 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 - 150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ) [Τομάτα (Υ), Μελιτζάνες (Υ)]: Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*), δόση: 10 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ) [Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ)]: Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*), δόση: 10 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾, (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ) [Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ)] **εφαρμογές με στάγδην άρδευση:** Για **Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), δόση: 16 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 200 - 500 λίτρα/στρέμμα. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ) [Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ)]: Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*), δόση: 10 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾, (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).

ΣΙΤΑΡΙ: Για **Αφίδες** (*Aphis nasturtii*, *Macrosiphum avenae*, *Macrosiphum dirhodum*, *Metopolophium dirhodum*, *Rhopalosiphum padi*), δόση: 14 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 - 50 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.

ΚΑΠΝΟΣ: Για **Αφίδες** (*Myzus sp.*), δόση: 14 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 40 - 60 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*), δόση: 7,5 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 80 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ [Τριανταφυλλίες (Υ + Θ)]: Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum* sp., *Aphis fabae*), δόση: 14 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών-εντόμων ⁽¹⁾, (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ: Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum* sp., *Aphis fabae*), δόση: 14 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Φράπα, Νεραντζιά, Περγαμόντο), **ΚΑΠΝΟΣ**: 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά), **ΣΙΤΑΡΙ**: Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά – **NASHI**, Κυδωνιά): Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΣΟΛΑΝΩΔΗ** (Υ) [Τομάτα (Υ), Μελιτζάνες (Υ)], **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ** (Θ) [Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ)]: Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ) [Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ)]:** Μέχρι **3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση)** ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **BAMBAKI:** Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ [Τριανταφυλλίες (Υ + Θ)], ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ: Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις: 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. 2) Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. 3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών. 4) Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.

[Θ: Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρου]

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): **Βαμβάκι:** 75. **Πορτοκαλιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Μανταρινιά, Λεμονιά, Κιτριά, Γκρέιπφρουτ, Φράπα:** 60. **Σιτάρι:** 28. **Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά Nashi, Κυδωνιά:** 21. **Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά:** 14. **Καπνός:** 7. **Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκύθι, Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ):** 1.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος ή εφαρμογές με στάγδην άρδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξέπλυμα με άφθονο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: - Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. - Επεμβάσεις με το προϊόν νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα. - Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας. - Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο

παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋπάρχουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. flonicamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά IRAC. - Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το προϊόν. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το flonicamid.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: i. σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --. ii. σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --. iii. της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ



H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

EUH208: Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει

αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε

τους κινδύνους για την

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία

UFI: WYY2-G06E-K004-FPDV

εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα. Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προσώπου εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα. Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προσώπου και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.» **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η΄ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). **SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν ασφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. **SPe8:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρουσίας μελισσών.

ALAKAZAM

500 WG



Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)
flonicamid

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: flonicamid 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 48,82% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΔΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14855/23.01.2024

Ημερ. Παραγωγής / Αρ. Παρτίδας:

Βλέπετε στην επιφάνεια της συσκευασίας.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

https://links.jtcrop.net/GR_Alakazam500WG



Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς προφυλάξεις και τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.

Οικ. Τετρ. 20 Β, Κ35-55, 57022, Βιομηχανική

περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 553354-7

E-mail: info@nitrofarm.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

500γρ.ε

Κάτοχος της άδειας:

JT Agro Europe sp z o.o.

Gate A, Aleja Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk, Πολωνία

www.jtcrop.com | info@jtcrop.com

